

눈이 그친 이후 전국 집중 소독 주간 운영 계획

- '23.12.27.(수)~'24.1.2.(화), 1주일 간 농장 내·외부 집중 소독 -

- ◆ 폭설로 인해 농장 소독이 소홀해 질 수 있는 상황임을 감안하여 눈이 그친 후 농장 환경 등의 오염원 제거를 위해 '집중 소독 주간' 운영
 - * 12.3일부터 전남·북 및 충남 소재 닭(산란계), 오리농장에서 고병원성 AI가 지속 검출(총 25건 : 오리 11건, 닭 14건)

□ 「전국 집중 소독 주간」 운영 개요

- (기간) '23. 12. 27.(수) ~ '24. 1. 2.(화), 일주일 간
- (소독대상) 전국 가금농장, 축산시설*, 축산차량, 전통시장, 계류장
 - * 가금류 도축장, 부화장, 사료공장, 분뇨·비료업체, 식용란 선별포장업·수집판매업 등
- (주요 활동) 농장·시설 종사자와 축산차량 운전자 등은 고압분무기 등 자체 소독장비로 농장·시설·차량과 사육 도구·장비 등 매일 소독
 - 농장 첫 출입시 소독하고, 소독 효과가 좋은 오후 2~3시에 집중 소독

□ 방역주체별 소독 요령

- (농장·시설 등 종사자) 자체 소독장비로 농장·시설 마당, 축사 전실, 집란실, 관리사, 농장·시설 내 차량·장비·기구 등을 일제히 소독
 - 눈 온 후 농장 입구 진입로에 생석회를 추가 도포하고 점검
- (차량 운전자) 농장 출입을 최대한 자제하고, 소속 시설 또는 거점소독시설 등에서 차량 내외부·운전자 소독

- 최근 국내 야생조류와 가금농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 지속 발생하고 있으며, 특히 폭설로 인해 소독이 어려운 여건을 감안하여 눈이 그친 이후 오염원을 없애기 위한 「전국 집중 소독주간」을 '23.12.27일부터 '24.1.2일까지 1주일간 운영합니다.
 - 가금농장과 축산 관계 시설의 종사자, 축산차량 운전자는 일주일간 매일 농장 마당과 시설, 차량 내외부를 집중적으로 소독해 주시기 바랍니다.
- 고병원성 조류인플루엔자 바이러스는 주로 차량 또는 사람, 장비 등 매개체를 통해 농장과 축사 내로 유입되고 있어, 적극적인 소독 활동을 통해 환경에 있는 바이러스를 제거하는 것이 중요합니다.
 - 특히, 겨울철은 폭설·한파 등 추워진 날씨로 소독장비가 얼거나 동파될 수 있어 매일 정상 작동 여부를 점검하는 등 각별한 주의가 필요합니다.
- 전국의 축산 관계자분들은 고병원성 조류인플루엔자 예방을 위해 집중 소독에 적극 참여해 주시기 바랍니다.
 - 첫째, 차량 진입로와 축사 전실, 퇴비장·집란실·관리사와 차량·장비·기구, 이동동선 등을 철저히 소독해 주시기 바랍니다.
 - 둘째, 농장·시설을 처음 들어갈 때 소독하고, 하루 중 기온이 높아 소독 효과가 좋은 오후 2시~3시에 집중 소독을 실시해 주시기 바랍니다.
 - 셋째, 농장 내 사람과 차량의 출입을 엄격히 통제하고, 농장진입로 생석회 추가 도포, 농장에 진입하는 차량은 고정식 소독기와 고압분무기로 2중 소독해야 합니다.
 - 넷째, 야생조류·설치류 등 야생동물에 의해 바이러스가 유입되지 않도록 사료빈·퇴비장 주변을 깨끗이 청소·소독하고 그물망 상태와 축사 틈새 여부를 점검하여 미흡한 사항은 즉시 보완해 주시기 바랍니다.
- 언제든지 고병원성 조류인플루엔자가 발생할 수 있는 엄중한 상황입니다. 가금농가 여러분들의 적극적인 방역 협조를 부탁드립니다.

고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 예방 「농장 4단계 소독」 요령

<p>1단계 농장 출입시 소독 철저</p> <p>농장진입로 폭 2m이상 생석회 충분히 도포</p> <p>출입구 고정식+고압분무기 2단계소독</p>  <p>- 1주일 간격 반복 도포 - 비는 내린 후 즉시 재도포</p> <p>- 고정식 소독시설로 소독한 후 고압분무기로 차량의 바퀴와 하부 등 추가 소독</p>	<p>2단계 농장 내부 관리 철저</p> <p>농장 내부(축사 밖) 매일 청소·소독</p> <p>부출입구·뒷문 폐쇄</p>  <p>※ 소독약은 용법용량 권장 희석배수 준수</p> <p>- 농장 내 야생조수류 유인 요소 (시료·폐사·축왕겨) 매일 청소·소독</p> <p>- 전실 미설치 축사 뒷문(쪽문) 폐쇄 - 방역·소독시설이 설치되지 않은 농장 부출입구 폐쇄</p>
<p>3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독</p> <p>축사 출입시 전용장화 갈아신기 손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시</p> <p>전실</p>  <p>※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체</p> <p>- 전실에 전용장화·손소독제 비치·전실 매일 소독 - 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용 - 장화 갈아신기용 구조물 또는 발판 설치</p>	<p>4단계 축사 내부 매일 소독</p> <p>축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독 정기적인 설치류 제거 및 안개분무 소독</p>  <p>- 사람·가축에 직접적인 소독제 분사 금지 - 가축과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지</p>

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.

